




Unité*Travail*Progrès

Centre des Opérations
d'urgences de Santé
Publique



RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO
SITREP N° 212 DU 14 JANVIER 2022



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{er} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	11 AU 13 JANVIER 2022
DATE DE PUBLICATION	14 JANVIER 2021

I. POINTS SAILLANTS

- 4 514 personnes dépistées du 11 au 13 janvier 2022 dont 2 314 par RT-PCR et 2200 par tests rapides antigéniques ;
- 229 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans quatre départements du pays ;
- **Aucun décès** notifié au cours des quatre derniers jours.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIE ET DE LA VACCINATION AU 13 JANVIER 2022

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES	CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES	TAUX DE LETALITE
333 076	23 244*	19 136	3 714	371	1,6%
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		NOUVEAUX DECES	
229	50**	23		0	
NOMBRE DE DOSES ADMINISTREES	POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT REÇU AU MOINS UNE DOSE		POURCENTAGE DE LA POPULATION COMPLETEMENT VACCINEE		
797 897	11,44%		10,74%		

* Notification tardive de 46 cas confirmés par tests rapides antigéniques à Pointe Noire.

** Données en cours d'actualisation.



Unité*Travail*Progrès

I.1. Situation de l'épidémie du 11 au 13 janvier 2022

Du 11 au 13 janvier 2022, **4 514** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville (**2 484**), de Pointe-Noire (**1 996**), du Kouilou (**28**), de la Lékoumou (**4**), et de la Cuvette (**2**).

Au total, **229** résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de **5,07%**. Parmi ces nouveaux cas, **17 (7,4%)** proviennent de la recherche active des cas suspects dans les formations sanitaires et des sujets contacts.

Le département de Brazzaville a enregistré **73** cas soit un taux de positivité de **2,9%**, celui de Pointe-Noire **150** cas avec un taux de positivité de **7,5%**, la Lékoumou **2** cas et le Kouilou **4** cas.

La répartition selon le sexe, pour les **229** cas confirmés, se présente comme suit : **171** cas (**74,7%**) chez les hommes et **58** cas (**25,3%**) chez les femmes.

I.2. Situation globale de l'épidémie au Congo

III.2.1. Courbe épidémique de la COVID-19

Du 14 mars 2020 au 13 janvier 2022, **333 076** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **23 244** cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique ci-dessous (figure 1) illustre l'évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19 au Congo, depuis le début de la pandémie. La 4^{ème} vague épidémique observée à la 52^{ème} semaine épidémiologique est toujours active. A la 1^{ère} semaine épidémiologique de l'année 2022, l'incidence observée est de **1 199** cas, soit une contraction de 156 cas. Pour les quatre premiers jours de la 2^{ème} semaine épidémiologique, 325 cas ont été enregistrés.




Figure 1 : Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 13 janvier 2022



Unité*Travail*Progrès

III.2.2. Evolution du taux de positivité au Congo

La figure 2 ci-dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité global depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. La première semaine épidémiologique de l'année 2022 est marquée par une régression significative du taux de positivité passant de 18,9% à 13,3%. Cette contraction traduit une tendance à la diminution de la transmission du SARS-CoV-2 au sein de la population après trois semaines de forte progression.




Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

III.2.3. Evolution du taux de positivité à Brazzaville et à Pointe Noire

La figure 3 ci-dessous met en évidence les variations du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire. Après trois semaines de progression, une tendance à la baisse est observée dans les deux grands centres urbains avec une contraction plus importante à Brazzaville passant de 19,2% à 11,2% plutôt qu'à Pointe-Noire avec une évolution à la baisse moins importante, passant d'un taux de positivité de 18,1% à la 52^{ème} semaine épidémiologique à 16% à la 1^{ère} semaine épidémiologique de l'année 2022.



Unité*Travail*Progrès




Figure 3 : Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et à Pointe-Noire

III.2.4. Evolution mensuelle de l'épidémie par département

Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition mensuelle des cas positifs de COVID-19 par département depuis le 14 mars 2020. au cours de cette période, 5 départements sur 12 ont rapporté de nouveaux cas de Covid-19.

Tableau 1 : Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

DEPARTEMENTS	Total 2020	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	Total 2021	Janv-22	Cumul
Bouenza	34	2	6	0	3	0	0	1	0	1	40	5	0	58	0	92
Brazzaville	4 680	713	760	520	397	373	550	300	264	637	1 782	625	1 589	8 510	852	14 042
Cuvette	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	8	6	57	2	113
Cuvette-Ouest	55	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	5	0	60
Kouilou	89	1	0	1	2	3	5	7	1	2	17	6	20	65	18	172
Lékoumou	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	8	12	30
Likouala	42	0	6	0	25	13	0	0	0	0	3	1	0	48	0	90
Niari	48	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	6	0	54
Plateaux	65	61	0	0	0	0	0	0	0	2	11	10	2	86	0	151
Pointe-Noire	1 901	347	112	452	615	346	257	185	136	272	1 645	485	605	5 457	864	8 222
Pool	21	1	1	2	5	0	0	1	0	0	0	4	3	17	0	38
Sangha	131	1	0	0	17	11	9	0	0	2	8	1	0	49	0	180
CONGO	7 130	1 126	885	975	1 071	747	823	495	401	916	3 553	1 149	2 225	14 366	1 748	23 244



III.2.5. Statut des malades

Comme le montre la figure 4 ci-dessous, environ de **8** patients sur **10** guérissent de la COVID-19, après leur prise en charge par les services de santé. A ce jour, **15,98%** des cas confirmés sont encore actifs.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut au 13 janvier 2022

I.3. Statut des cas confirmés selon le sexe

Tableau 2 : Répartition des cas de COVID-19 selon le statut et le sexe

Sexe	Total	Guéris		Décédés	
	n	n	Taux de guérison (%)	n	Taux de létalité (%)
Féminin	8 116	6 581	81,1	107	1,3
Masculin	15 128	12 555	83,0	264	1,7
Total	23 244	19 136	82,3	371	1,6

Les taux de guérison et de létalité ne diffèrent pas significativement selon le sexe bien que la létalité observée soit légèrement élevée chez les hommes.

I.4. Statut des cas confirmés selon l'âge

Comme le montre le tableau 3 ci-dessous, le groupe d'âge de 30 à 49 ans reste la tranche d'âge la plus touchée par la pandémie de Covid-19 dans notre pays. L'âge minimum des patients est de 6 jours et le maximum de 98 ans. L'âge moyen des patients COVID-19 est de 41 ans.



Tableau 3 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge et statut du 14 mars 2020 au 13 janvier 2022

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	2	0,1	22	0,1	0	0,0	24	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	10	0,3	58	0,3	0	0,0	68	0,3	0,0
5 à 9	4	1,7	42	1,1	138	0,7	0	0,0	180	0,8	0,0
10 à 19	9	3,9	229	6,2	920	4,8	3	0,8	1 152	5,0	0,3
20 à 29	27	11,8	634	17,1	2 878	15,0	7	1,9	3 519	15,1	0,2
30 à 39	68	29,7	1 050	28,3	5 237	27,4	20	5,4	6 311	27,2	0,3
40 à 49	65	28,4	893	24,0	5 014	26,2	38	10,2	5 955	25,6	0,6
50 à 59	40	17,5	542	14,6	2 937	15,3	102	27,5	3 584	15,4	2,8
60 à 69	9	3,9	204	5,5	1 411	7,4	100	27,0	1 719	7,4	5,8
70 à 79	6	2,6	82	2,2	403	2,1	68	18,3	555	2,4	12,3
≥80	1	0,4	26	0,7	118	0,6	33	8,9	177	0,8	18,6
Total	229	100,0	3 714	100,0	19 136	100,0	371	100,0	23 244	100,0	1,6

I.5. Situation des décès COVID-19 au Congo

Du 14 mars 2020 au 13 janvier 2022, **403** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **371 (92,1%)** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès des cas suspects.

Parmi les **371** décès des cas de COVID-19, **303 (81,7%)** sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3 (0,8%)** chez les sujets de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de 60,6 ans.

Dans la tranche d'âge de **30 à 49** ans, tranche très active de la population congolaise, **58** décès ont été malheureusement observés, soit environ **15,6%** de l'ensemble de décès.

I.6. Létalité selon l'âge et le sexe

Le taux de létalité globale est de 1,6%. Il est de 18,6% chez les patients âgés d'au moins 80 ans. Il augmente proportionnellement avec l'âge des patients.

La figure 5 ci-dessous montre que le taux de létalité est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à partir de la tranche d'âge de 50 à 59 ans.



Unité*Travail*Progrès




Figure 5 : Taux de létalité selon l'âge et le sexe

I.7. Evolution des décès par semaine épidémiologique

La figure 6 ci-dessous présente la situation hebdomadaire des décès des cas confirmés de COVID-19, enregistrés au Congo. Depuis trois semaines de l'année 2021, le nombre de décès est resté stable. A la première semaine de 2022, 2 décès sont notifiés.




Figure 6 : Evolution hebdomadaire des décès du 14 mars 2020 au 13 janvier 2022



Unité*Travail*Progrès

I.8. Situation de l'épidémie par département et par district sanitaire

Tableau 4 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 13 janvier 2022

Départements et Districts sanitaires	Nouveaux cas (11 au 13 janv-22)	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M	Létalité
Bouenza	0	92	0	7	85	0	64	28	7,6
Loudima	0	6	0	0	6	0	5	1	0,0
Loutété	0	13	0	0	13	0	12	1	0,0
Madingou	0	4	0	0	4	0	2	2	0,0
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	2	1	0,0
Nkayi-Kayes	0	66	0	7	59	0	43	23	10,6
Brazzaville	73	14 042	2 265	210	11 546	21	8 538	5 504	1,5
Bacongo	6	1 095	181	14	900	0	682	413	1,3
Djiri	8	1 364	186	9	1 167	2	835	529	0,7
Madibou	4	726	137	12	576	1	415	311	1,7
Makélékélé	4	1 306	195	20	1 090	1	794	512	1,5
Mfilou	2	1 015	183	11	821	0	600	415	1,1
Moungali	22	2 862	516	42	2 301	3	1 649	1 213	1,5
Ouenzé	8	1 380	234	19	1 126	1	810	570	1,4
Poto- Poto	14	2 650	390	51	2 196	13	1 662	988	1,9
Talangai	5	1 635	242	32	1 361	0	1 087	548	2,0
Île Mbamou	0	9	1	0	8	0	4	5	0,0
Cuvette	0	113	6	1	106	0	76	37	0,9
Oyo-Alima	0	113	6	1	106	0	76	37	0,9
Cuvette-Ouest	0	60	0	0	60	0	56	4	0,0
Ewo	0	56	0	0	56	0	53	3	0,0
Etoumbi	0	4	0	0	4	0	3	1	0,0
Kouilou	4	172	29	2	141	0	115	57	1,2
Hinda-Loango	3	146	27	2	117	0	101	45	1,4
Madingo-Kayes-Nzambi	1	23	2	0	21	0	12	11	0,0
Mvouti-Kakamoeka	0	3	0	0	3	0	2	1	0,0
Lékoumou	2	30	12	1	17	0	21	9	3,3
Sibiti	0	18	0	1	17	0	14	4	5,6
Zanaga	2	12	12	0	0	0	7	5	0,0
Likouala	0	90	0	1	89	0	76	14	1,1
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	56	11	1,5
Impfondo	0	23	0	0	23	0	20	3	0,0
Niari	0	54	0	5	49	0	29	25	9,3
Dolisie	0	48	0	5	43	0	24	24	10,4
Kimongo	0	6	0	0	6	0	5	1	0,0



Unité*Travail*Progrès

Départementset Districts sanitaires	Nouveaux cas (11 au 13 janv-22)	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M	Taux de Létalité
Plateaux	0	151	0	0	151	0	111	40	0,0
Gamboma	0	28	0	0	28	0	19	9	0,0
Djambala-Lékana	0	123	0	0	123	0	92	31	0,0
Pointe-Noire	150	8 222	1 400	141	6 679	2	5 875	2 347	1,7
Loandjili	23	1 356	175	44	1 136	1	1 008	348	3,2
Lumumba	93	4 262	828	66	3 367	1	3 000	1 262	1,5
Mongo-Mpoukou	7	880	135	11	734	0	602	278	1,3
Mvoumvou	1	224	30	4	190	0	146	78	1,8
Ngoyo	20	903	153	8	742	0	678	225	0,9
Tchiamba-nzassi	0	113	4	1	108	0	94	19	0,9
Tié-Tié	6	484	75	7	402	0	347	137	1,4
Pool	0	38	2	0	36	0	26	12	0,0
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	3	0	0,0
Kintelé(Commune)	0	25	0	0	25	0	17	8	0,0
Kinkala	0	10	2	0	8	0	6	4	0,0
Sangha	0	180	0	3	177	0	141	39	1,7
Ouessou	0	174	0	3	171	0	135	39	1,7
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	6	0	0,0
CONGO	229	23 244	3 714	371	19 136	23	15 128	8 116	1,6

Selon le tableau 4 ci-dessus, les districts sanitaires ayant enregistré les taux de létalité les plus élevés sont Nkayi-Kayes (**10,6%**) dans le département de la Bouenza et Dolisie dans le département du Niari (**10,4%**). **Ces taux de létalité élevés dans ces localités peuvent s'expliquer par la faible capacité de la prise en charge de cas.**

Les départements de la Cuvette-Ouest, des Plateaux et du Pool n'ont enregistré aucun décès depuis le début de l'épidémie.



I.9. Indicateurs clés de la riposte

Tableau 5 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de COVID-19 du 14 mars 2020 au 13 janvier 2022

Indicateurs	Période couverte	
	3 derniers jours	Cumul depuis le 14 Mars 2020
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	254	11 836
Contacts	1 943	30 986
Contacts suivis	1 930	30 867
Cas suspects	254	10 545
Prélèvements réalisés par les EIR	2 184	175 449
EIR fonctionnelles	10	
Interventions réalisées	30	12 016
Passagers en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE ET RECHERCHE		
Nombre de tests réalisés	4 514	333 076
Nombre de tests positifs	229	23 244
Nombre de tests réalisés chez les animaux de compagnie	0	105
Nombre de tests positifs chez les animaux de compagnie (taux de positivité)	0	14 (13,3%)
PCI		
Nombre d'EDS COVID-19 réalisés	0	371
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	03	300
Nombre de femmes enceintes	0	13
Nombre de cas évadés	0	10
Nombre de patients sous oxygène au 13 Janvier 2022	10	
Décès COVID-19 des personnes vaccinées	0	6
VACCINATION COVID-19		
	Du 12 au 13 Janvier 2022	Cumul depuis le 24 Mars 2021
Nombre total de doses administrées	3 272	794 897
Nombre de MAPI notifiées	0	1574
Nombre de MAPI graves	0	41
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	71	162 655
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	0	126 010
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	0	14 156
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	0	10 225
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Pfizer	26	239
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Pfizer	0	0
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light (unidose)	69	106 261
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	3 106	378 351
Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin	3 272	661 662
Nombre de personnes complètement vaccinées	3 175	620 847
% des personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin		11,44%
% de personnes complètement vaccinées		10,74%



III. SITUATION DE LA VACCINATION AU CONGO

III.1. Situation globale de la vaccination

Depuis le lancement de la vaccination en République du Congo, le 25 mars 2021, **661 662** personnes ont reçu au moins une dose soit un pourcentage de **11,44%**. Le taux de couverture vaccinale de la population complètement vaccinée est de **10,74%**.

III.2. Situation de la vaccination selon les départements

Selon le tableau 6 ci-dessous, le département du Kouilou présente **29,18%** de la couverture vaccinale des personnes complètement vaccinées. Les départements les moins performants sont : les Plateaux et le Pool.

Tableau N°6 : Situation de la vaccination par département au 13 janvier 2022

Département	Cible	Pop. ayant reçu au moins une dose	% Pop. ayant reçu au moins une dose	Pop. complètement vaccinée	% Pop. complètement vaccinée
Cuvette	236 170	19 524	8,27%	17 146	7,26%
Kouilou	114 020	34 807	30,53%	33 273	29,18%
Niari	349 858	27 937	7,99%	25 352	7,25%
Plateaux	264 123	12 198	4,62%	11 931	4,52%
Likouala	233 172	14 512	6,22%	11 993	5,14%
Lékoumou	145 850	10 065	6,90%	8 895	6,10%
Brazzaville	2 072 394	305 324	14,73%	289 716	13,98%
Pointe-Noire	1 271 579	161 877	12,73%	153 544	12,08%
Sangha	129 832	15 372	11,84%	12 029	9,27%
Cuvette-Ouest	110 436	6 768	6,13%	6 530	5,91%
Pool	386 508	14 759	3,82%	13 454	3,48%
Bouenza*	467 569	38 519	8,24%	36 984	7,91%
National	5 781 511	661 662	11,44%	620 847	10,74%

* Données du département de la Bouenza en cours d'actualisation

Légende du tableau :  <5%  5 – 10%  10 – 15 %  >15



IV. MISE EN MISE OEUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

VI. 1. Coordination

- ✓ Tenue d'une réunion de coordination technique.

VI. 2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- ✓ Poursuite de la mobilisation des relais communautaires pour la recherche active des cas ;
- ✓ Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- ✓ Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes) ;
- ✓ Poursuite du déploiement des équipes d'intervention rapide (EIR) pour la recherche active des cas dans les formations sanitaires et la communauté à Brazzaville et à Pointe- Noire ;
- ✓ Organisation d'une réunion de mise au point avec la direction départementale des soins et services de santé de Brazzaville.

VI. 3. Prise en charge des cas

A la date du 13 Janvier 2022, **2 638** patients sont suivis par les services de santé dont **2 590** en ambulatoire et **48** en hospitalisation répartis ainsi qu'il suit :

- ❖ **Brazzaville** : **13** patients en hospitalisation dont **4** sous oxygène :
 - Structures publiques : **12** patients dont **4** sous oxygène ;
 - Structures privées : **1** patient hospitalisé ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **1 342**.

- ❖ **Pointe-Noire** : **29** patients en hospitalisation dont **6** sous oxygène :
 - Structures publiques : **25** dont **6** sous oxygène ;
 - Structures privées : **4** patients hospitalisés.

Le nombre de patients suivis à domicile est de **1 193**.

- ❖ **Kouilou** : **39** patients en cours de suivi dans le district de Hinda-Loango ;
- ❖ **Cuvette**: **3** patients en cours de suivi dont **1** hospitalisé dans le district d'Oyo-Alima ;
- ❖ **Pool**: **7** patients en cours de suivi
 - **2** patients suivis en ambulatoire respectivement à Kinkala et à BOKO ;
 - **5** patients hospitalisés dont **3** à Linzolo, **1** à Kindamba et **1** à Mindouli ;
- ❖ **Lékoumou** : **12** patients en cours de suivi dans le district de Zanaga.



VI. 4. Laboratoire et Recherche

Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).

VI. 5. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques

- ✓ Distribution de **100** dispositifs de lavage des mains (DLM) dans les administrations et les formations sanitaires de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
- ✓ Formation des formateurs du Conseil Islamique du Congo sur la sensibilisation en lien avec la vaccination ;
- ✓ Distribution des pulvérisateurs dans les morgues et les formations sanitaires de Brazzaville;
- ✓ Poursuite de la location des panneaux publicitaires sur l'incitation à la vaccination dont **14** à Brazzaville et **22** à Pointe-Noire.

VI. 6. Sécurité

Suivi de la mise en œuvre des mesures de riposte contre la Covid-19 édictées par le Gouvernement, notamment :

- ✓ Surveillance du respect des mesures barrières et respect du couvre-feu ;
- ✓ tenue des points d'entrée et sortie des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
- ✓ sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- ✓ Réalisation des interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile ;
- ✓ Accompagnement sécuritaire d'un enterrement digne et sécurisé à Brazzaville.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique
(COUSP)



34 - 34