




Unité\*Travail\*Progrès

Centre des Opérations  
d'urgences de Santé  
Publique



**RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO**  
**SITREP N° 214 DU 21 JANVIER 2022**



DATE DE NOTIFICATION DU 1 <sup>er</sup> CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	18 AU 20 JANVIER 2022
DATE DE PUBLICATION	21 JANVIER 2021

**I. POINTS SAILLANTS**

- 3 954 personnes dépistées du 18 au 20 janvier 2022 dont 2 140 par RT-PCR et 1 814 par tests rapides antigéniques ;
- 73 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans trois départements du pays ;
- **Aucun décès** notifié au cours des trois derniers jours.

**II. SITUATION EPIDEMIOLOGIE ET DE LA VACCINATION AU 20 JANVIER 2022**

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES	CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES	TAUX DE LETALITE
340 922*	23 485**	19 298	3 793	371	1,6%
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		NOUVEAUX DECES	
73	50***	23		0	
NOMBRE DE DOSES ADMINISTREES	POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT REÇU AU MOINS UNE DOSE		POURCENTAGE DE LA POPULATION COMPLETEMENT VACCINEE		
803 729	11,54%		10,84%		

\*Notification tardive de 82 tests antigéniques.

\*\*Notification tardive de 32 cas confirmés, 18 à Pointe Noire et 14 dans la Cuvette.

\*\* Données en cours d'actualisation.



Unité\*Travail\*Progrès

### I.1. Situation de l'épidémie du 19 au 20 janvier 2022

Du 19 au 20 janvier 2022, **3 954** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville (**2 125**), de Pointe-Noire (**1 758**), du Kouilou (**42**), de la Cuvette (**25**), de la Lékoumou (**3**) et la Bouenza (**1**).

Au total, **73** résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de **1,8%**. Parmi ces nouveaux cas, **5 (6,8%)** proviennent de la recherche active des cas suspects dans les formations sanitaires et des sujets contacts.

Le département de Brazzaville a enregistré **27** cas soit un taux de positivité de **1,3%**, celui de Pointe-Noire **40** cas avec un taux de positivité de **2,3%**, et la Cuvette **6 cas**.

La répartition par sexe des **73** cas confirmés, se présente comme suit : **47 cas (64,4%)** chez les hommes et **26 cas (35,6%)** chez les femmes.

### I.2. Situation globale de l'épidémie au Congo

#### III.2.1. Courbe épidémique de la COVID-19

Du 14 mars 2020 au 20 janvier 2022, **340 922** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **23 485** cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique ci-dessous (figure 1) illustre l'évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19 au Congo, depuis le début de la pandémie. A la 2<sup>ème</sup> semaine épidémiologique de l'année 2022, l'incidence observée est de **440** cas, soit une contraction de 769 cas par rapport à la 1<sup>ère</sup> semaine, ce qui présage la fin de la quatrième vague épidémique. Pour la semaine 3 en cours, le nombre de cas confirmés est de 112.




Figure 1 : Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 20 janvier 2022



Unité\*Travail\*Progrès

### III.2.2. Evolution du taux de positivité au Congo

La figure 2 ci-dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité global depuis la 13<sup>ème</sup> semaine épidémiologique de 2020. Depuis la première semaine épidémiologique de l'année 2022, nous observons une diminution importante du taux de positivité passant de 5,1% à 2,1%.




Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13<sup>ème</sup> semaine épidémiologique de 2020.

### III.2.3. Evolution du taux de positivité à Brazzaville et à Pointe Noire

La figure 3 ci-dessous met en évidence les variations du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire. Après trois semaines de progression, une tendance à la baisse est observée dans les deux épicentres de l'épidémie.



Unité\*Travail\*Progrès




Figure 3 : Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et à Pointe-Noire

### III.2.4. Evolution mensuelle de l'épidémie par département

Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition mensuelle des cas positifs de COVID-19 par département depuis le 14 mars 2020. Au cours de cette période, 5 départements sur 12 ont rapporté de nouveaux cas de Covid-19.

Tableau 1 : Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

DEPARTEMENTS	Total 2020	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	Total 2021	Janv-22	Cumul
Bouenza	34	2	6	0	3	0	0	1	0	1	40	5	0	58	0	92
Brazzaville	4 680	713	760	520	397	373	550	300	264	637	1 782	625	1 589	8 510	939	14 129
Cuvette	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	8	6	57	23	134
Cuvette-Ouest	55	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	5	0	60
Kouilou	89	1	0	1	2	3	5	7	1	2	17	6	20	65	21	175
Lékoumou	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	8	12	30
Likouala	42	0	6	0	25	13	0	0	0	0	3	1	0	48	0	90
Niari	48	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	6	0	54
Plateaux	65	61	0	0	0	0	0	0	0	2	11	10	2	86	0	151
Pointe-Noire	1 901	347	112	452	615	346	257	185	136	272	1 645	485	609	5 461	990	8 352
Pool	21	1	1	2	5	0	0	1	0	0	0	4	3	17	0	38
Sangha	131	1	0	0	17	11	9	0	0	2	8	1	0	49	0	180
<b>CONGO</b>	<b>7 130</b>	<b>1 126</b>	<b>885</b>	<b>975</b>	<b>1 071</b>	<b>747</b>	<b>823</b>	<b>495</b>	<b>401</b>	<b>916</b>	<b>3 553</b>	<b>1 149</b>	<b>2 229</b>	<b>14 370</b>	<b>1 985</b>	<b>23 485</b>



### III.2.5. Statut des malades

Comme le montre la figure 4 ci-dessous, environ **8** patients sur **10** guérissent de la COVID-19, après leur prise en charge par les services de santé. A ce jour, **16,15%** des cas confirmés sont encore actifs.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut au 20 janvier 2022

### I.3. Statut des cas confirmés selon le sexe

Tableau 2 : Répartition des cas de COVID-19 selon le statut et le sexe

Sexe	Total	Guéris		Décédés	
	N	n	Taux de guérison (%)	n	Taux de létalité (%)
Féminin	8 204	6 634	80,9	107	1,3
Masculin	15 281	12 664	82,9	264	1,7
<b>Total</b>	<b>23 485</b>	<b>19 298</b>	<b>82,2</b>	<b>371</b>	<b>1,6</b>

Les taux de guérison et de létalité ne diffèrent pas significativement selon le sexe bien que la létalité observée soit légèrement élevée chez les hommes.

### I.4. Statut des cas confirmés selon l'âge

Comme le montre le tableau 3 ci-dessous, le groupe d'âge de 30 à 49 ans reste la tranche d'âge la plus touchée par la pandémie de Covid-19 dans notre pays. L'âge minimum des patients est de 6 jours et le maximum de 98 ans. L'âge moyen des patients COVID-19 est de 41 ans.



**Tableau 3 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge et statut du 14 mars 2020 au 20 janvier 2022**

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	N	%	n	%	N	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	2	0,1	22	0,1	0	0,0	24	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	13	0,3	58	0,3	0	0,0	71	0,3	0,0
5 à 9	1	1,4	46	1,2	138	0,7	0	0,0	184	0,8	0,0
10 à 19	4	5,5	240	6,3	927	4,8	3	0,8	1 170	5,0	0,3
20 à 29	3	4,1	642	16,9	2 899	15,0	7	1,9	3 548	15,1	0,2
30 à 39	20	27,4	1 076	28,4	5 276	27,3	20	5,4	6 376	27,1	0,3
40 à 49	24	32,9	923	24,3	5 050	26,2	38	10,2	6 021	25,6	0,6
50 à 59	13	17,8	539	14,2	2 973	15,4	102	27,5	3 617	15,4	2,8
60 à 69	6	8,2	203	5,4	1 429	7,4	100	27,0	1 736	7,4	5,8
70 à 79	2	2,7	82	2,2	406	2,1	68	18,3	558	2,4	12,2
≥80	0	0,0	27	0,7	120	0,6	33	8,9	180	0,8	18,3
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>	<b>3 793</b>	<b>100,0</b>	<b>19 298</b>	<b>100,0</b>	<b>371</b>	<b>100,0</b>	<b>23 485</b>	<b>100,0</b>	<b>1,6</b>

### I.5. Situation des décès COVID-19 au Congo

Du 14 mars 2020 au 20 janvier 2022, **403** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **371 (92,1%)** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès des cas suspects.

Parmi les **371** décès des cas de COVID-19, **303 (81,7%)** sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3 (0,8%)** chez les sujets de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de 60,6 ans.

Dans la tranche d'âge de **30 à 49** ans, tranche très active de la population congolaise, **58** décès ont été malheureusement observés, soit environ **15,6%** de l'ensemble de décès.

### I.6. Létalité selon l'âge et le sexe

Le taux de létalité globale est de 1,6%. Il est de 18,3% chez les patients âgés d'au moins 80 ans. Il augmente proportionnellement avec l'âge des patients.

La figure 5 ci-dessous montre que le taux de létalité est plus élevé chez les hommes



Unité\*Travail\*Progrès

que chez les femmes à partir de la tranche d'âge de 50 à 59 ans.




Figure 5 : Taux de létalité selon l'âge et le sexe

### I.7. Evolution des décès par semaine épidémiologique

La figure 6 ci-dessous présente la situation hebdomadaire des décès des cas confirmés de COVID-19, enregistrés au Congo. Depuis trois semaines de l'année 2022, le nombre de décès est resté stable. A la 2<sup>ème</sup> semaine épidémiologique de 2022, aucun décès n'a été notifié.




Figure 6 : Evolution hebdomadaire des décès du 14 mars 2020 au 20 janvier 2022





Unité\*Travail\*Progrès

## I.8.Situation de l'épidémie par département et par district sanitaire

Tableau 4 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 20 janvier 2022

Départements et Districts sanitaires	Nouveaux cas (18 au 22 janv-22)	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M	Létalité
<b>Bouenza</b>	0	92	0	7	85	0	64	28	7,6
Loudima	0	6	0	0	6	0	5	1	0,0
Loutété	0	13	0	0	13	0	12	1	0,0
Madingou	0	4	0	0	4	0	2	2	0,0
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	2	1	0,0
Nkayi-Kayes	0	66	0	7	59	0	43	23	10,6
<b>Brazzaville</b>	27	14 129	2 206	210	11 692	21	8 586	5 543	1,5
Bacongo	4	1 099	174	14	911	0	684	415	1,3
Djiri	1	1 368	176	9	1 181	2	839	529	0,7
Madibou	0	730	134	12	583	1	416	314	1,6
Makélékélé	2	1 312	192	20	1 099	1	797	515	1,5
Mfilou	1	1 027	194	11	822	0	604	423	1,1
Moungali	13	2 888	518	42	2 325	3	1 665	1 223	1,5
Ouenzé	2	1 389	228	19	1 141	1	816	573	1,4
Poto- Poto	2	2 662	359	51	2 239	13	1 669	993	1,9
Talangai	2	1 645	230	32	1 383	0	1 092	553	1,9
Île Mbamou	0	9	1	0	8	0	4	5	0,0
<b>Cuvette</b>	6	134	27	1	106	0	86	48	0,7
Oyo-Alima	6	134	27	1	106	0	86	48	0,7
<b>Cuvette-Ouest</b>	0	60	0	0	60	0	56	4	0,0
Ewo	0	56	0	0	56	0	53	3	0,0
Etoumbi	0	4	0	0	4	0	3	1	0,0
<b>Kouilou</b>	0	175	31	2	142	0	118	57	1,1
Hinda-Loango	0	149	29	2	118	0	104	45	1,3
Madingo-Kayes-Nzambi	0	23	2	0	21	0	12	11	0,0
Mvouti-Kakamoeka	0	3	0	0	3	0	2	1	0,0
<b>Lékoumou</b>	0	30	12	1	17	0	21	9	3,3
Sibiti	0	18	0	1	17	0	14	4	5,6
Zanaga	0	12	12	0	0	0	7	5	0,0
<b>Likouala</b>	0	90	0	1	89	0	76	14	1,1
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	56	11	1,5
Impfondo	0	23	0	0	23	0	20	3	0,0
<b>Niari</b>	0	54	0	5	49	0	29	25	9,3
Dolisie	0	48	0	5	43	0	24	24	10,4
Kimongo	0	6	0	0	6	0	5	1	0,0





Unité\*Travail\*Progrès

Départementset Districts sanitaires	Nouveaux cas (18 au 20 janv-22)	Cumul depuis le 14 Mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M	Taux de Létalité
<b>Plateaux</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>
Gamboma	0	28	0	0	28	0	19	9	0,0
Djambala-Lékana	0	123	0	0	123	0	92	31	0,0
<b>Pointe-Noire</b>	<b>40</b>	<b>8 352</b>	<b>1 515</b>	<b>141</b>	<b>6 694</b>	<b>2</b>	<b>5 967</b>	<b>2 385</b>	<b>1,7</b>
Loandjili	4	1 366	184	44	1 137	1	1 015	351	3,2
Lumumba	31	4351	906	66	3 378	1	3 065	1 286	1,5
Mongo-Mpoukou	0	889	143	11	735	0	610	279	1,2
Mvoumvou	3	229	35	4	190	0	150	79	1,7
Ngoyo	1	915	163	8	744	0	683	232	0,9
Tchiamba-nzassi	0	114	5	1	108	0	95	19	0,9
Tié-Tié	1	488	79	7	402	0	349	139	1,4
<b>Pool</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	3	0	0,0
Kintelé(Commune)	0	25	0	0	25	0	17	8	0,0
Kinkala	0	10	2	0	8	0	6	4	0,0
<b>Sangha</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>39</b>	<b>1,7</b>
Ouessou	0	174	0	3	171	0	135	39	1,7
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	6	0	0,0
<b>CONGO</b>	<b>73</b>	<b>23 485</b>	<b>3 793</b>	<b>371</b>	<b>19 298</b>	<b>23</b>	<b>15 281</b>	<b>8 204</b>	<b>1,6</b>

Selon le tableau 4 ci-dessus, les districts sanitaires ayant enregistré les taux de létalité les plus élevés sont Nkayi-Kayes (**10,6%**) dans le département de la Bouenza et Dolisie dans le département du Niari (**10,4%**). Ces taux de létalité élevés dans ces localités peuvent s'expliquer par la faible capacité de la prise en charge de cas.

Les départements de la Cuvette-Ouest, des Plateaux et du Pool n'ont enregistré aucun décès depuis le début de l'épidémie.



## I.9. Indicateurs clés de la riposte

Tableau 5 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de COVID-19 du 14 mars 2020 au 20 janvier 2022

Indicateurs	Période couverte	
	3 derniers jours	Cumul depuis le 14 Mars 2020
<b>SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE</b>		
Alertes	162	12 027
Contacts	1 622	33 885
Contacts suivis	1 613	33 754
Cas suspects	162	10 736
Prélèvements réalisés par les EIR	1 775	178 527
EIR fonctionnelles	10	
Interventions réalisées	30	12 070
Passagers en quarantaine	0	1 496
<b>LABORATOIRE ET RECHERCHE</b>		
Nombre de tests réalisés	3 954	340 922
Nombre de tests positifs	73	23 485
Nombre de tests réalisés chez les animaux de compagnie	0	105
Nombre de tests positifs chez les animaux de compagnie (taux de positivité)	0	14 (13,3%)
<b>PCI</b>		
Nombre d'EDS COVID-19 réalisés	0	371
<b>PRISE EN CHARGE</b>		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	300
Nombre de femmes enceintes	0	13
Nombre de cas évadés	0	10
Nombre de patients sous oxygène au 20 Janvier 2022	8	
Décès COVID-19 des personnes vaccinées	0	6
<b>VACCINATION COVID-19</b>		<b>Cumul depuis le 24 Mars 2021</b>
Nombre total de doses administrées	1 189	803 729
Nombre de MAPI notifiées	7	1 601
Nombre de MAPI graves	1	42
Nombre de personnes ayant reçu 1 <sup>ère</sup> dose de vaccin Sinopharm	0	162 787
Nombre de personnes ayant reçu 2 <sup>ème</sup> dose de vaccin Sinopharm	48	126 267
Nombre de personnes ayant reçu 1 <sup>ère</sup> dose de vaccin Sputnik V	0	14 156
Nombre de personnes ayant reçu 2 <sup>ème</sup> dose de vaccin Sputnik V	0	10 225
Nombre de personnes ayant reçu 1 <sup>ère</sup> dose de vaccin Pfizer	0	298
Nombre de personnes ayant reçu 2 <sup>ème</sup> dose de vaccin Pfizer	0	0
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light (unidose)	0	106 261
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	1 141	383 735
Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin	1 141	667 237
Nombre de personnes complètement vaccinées	1 189	626 488
% des personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin		11,54%
% de personnes complètement vaccinées		10,84%



### III. SITUATION DE LA VACCINATION AU CONGO

#### III.1. Situation globale de la vaccination

Depuis le lancement de la vaccination en République du Congo, le 25 mars 2021, 667 237 personnes ont reçu au moins une dose soit un pourcentage de 11,54%. Le taux de couverture vaccinale de la population complètement vaccinée est de 10,84%.

#### III.2. Situation de la vaccination selon les départements

Selon le tableau 6 ci-dessous, le département du Kouilou présente 29,56% de la couverture vaccinale des personnes complètement vaccinées. Les départements les moins performants sont : les Plateaux et le Pool.

Tableau N°6 : Situation de la vaccination par département au 20 janvier 2022

Département	Cible	Pop. ayant reçu au moins une dose	% Pop. ayant reçu au moins une dose	Pop. complètement vaccinée	% Pop. complètement vaccinée
Cuvette	236 170	19 524	8,27%	17 146	7,26%
Kouilou	114 020	35 236	30,90%	33 710	29,56%
Niari	349 858	27 937	7,99%	25 352	7,25%
Plateaux	264 123	12 212	4,62%	11 945	4,52%
Likouala	233 172	14 512	6,22%	11 993	5,14%
Lékoumou	145 850	10 128	6,94%	9 006	6,17%
Brazzaville	2 072 394	305 959	14,76%	290 258	14,01%
Pointe-Noire	1 271 579	162 110	12,75%	153 765	12,09%
Sangha	129 832	15 432	11,89%	12 215	9,41%
Cuvette-Ouest	110 436	6 768	6,13%	6 530	5,91%
Pool	386 508	14 822	3,83%	13 506	3,49%
Bouenza	467 569	42 597	9,11%	41 062	8,78%
<b>National</b>	<b>5 781 511</b>	<b>667 237</b>	<b>11,54%</b>	<b>626 488</b>	<b>10,84%</b>

Légende du tableau :  <5%  5 – 10%  10 – 15 %  >15



## IV. MISE EN MISE OEUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

### VI. 1. Coordination

- ✓ Tenue d'une réunion de coordination technique.

### VI. 2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- ✓ Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- ✓ Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes) ;
- ✓ Poursuite du déploiement des équipes d'intervention rapide (EIR) pour la recherche active des cas dans les formations sanitaires et la communauté à Brazzaville et à Pointe- Noire.

### VI. 3. Prise en charge des cas

A la date du 20 Janvier 2022, **2 168** patients sont suivis par les services de santé dont **2 137** en ambulatoire et **31** en hospitalisation répartis ainsi qu'il suit :

- ❖ **Brazzaville** : **09** patients en hospitalisation dont **1** sous oxygène :
  - Structures publiques : **09** patients dont **1** sous oxygène ;
  - Structures privées : **aucun** patient hospitalisé ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **945**.

- ❖ **Pointe-Noire** : **13** patients en hospitalisation dont **7** sous oxygène :
  - Structures publiques : **10** dont **6** sous oxygène ;
  - Structures privées : **3** dont **1** sous oxygène.

Le nombre de patients suivis à domicile est de **1 122**.

- ❖ **Kouilou** : **30** patients en cours de suivi dans le district de Hinda-Loango ;
- ❖ **Cuvette**: **26** patients en cours de suivi dont **2** hospitalisés dans le district d'Oyo-Alima;
- ❖ **Pool**: **9** patients en cours de suivi
  - **2** patients suivis en ambulatoire respectivement à Kinkala et à BOKO ;
  - **7** patients hospitalisés dont **5** à Linzolo, **1** à Kindamba et **1** à Mindouli ;
- ❖ **Lékoumou** : **14** patients en cours de suivi dans le district de Zanaga.

### VI. 4. Laboratoire et Recherche

Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).



### **VI. 5. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques**

- ✓ Poursuite de la distribution des DLM et pulvérisateurs dans les FOSA ;
- ✓ Diffusion de l'émission Espace Covid-19 du Pr Ossibi Ibara, Président de la commission Prise en charge ;
- ✓ Sensibilisation et formation des 10 chefs des quartiers de la Mairie de Ouenzé ;
- ✓ Diffusion des affiches sur 60 taxi et 14 écrans dans la ville de Brazzaville sur l'incitation à la vaccination ;
- ✓ Poursuite de la location des panneaux publicitaires sur l'incitation à la vaccination dont **14** à Brazzaville et **22** à Pointe-Noire.

### **VI. 6. Sécurité**

Suivi de la mise en œuvre des mesures de riposte contre la Covid-19 édictées par le Gouvernement, notamment :

- ✓ Surveillance du respect des mesures barrières et respect du couvre-feu ;
- ✓ tenue des points d'entrée et sortie des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
- ✓ sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- ✓ Réalisation des interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile.

**Pour plus d'informations, contacter :**

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique  
(COUSP)



**34 - 34**