



# BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

ACTUALIZADO: 17-01-2025, às 18h

BOLETIM Nº 10/2025  
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 3

## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM ANGOLA

TOTAL DE CASOS

**508**

TOTAL DE ÓBITOS

**27**

MASCULINO

FEMININO

**238**

**270**

MASCULINO

FEMININO

**19**

**8**

## DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Taxa de Letalidade (%)
Bengo	Barra do Dande	0	0	0	4	2	1	25,0
	Dande	13	10	1	26	13	2	7,7
	Panguila	0	0	0	5	0	1	20,0
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11,4</b>
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	2	1	0	0,0
	Sequele	6	6	0	87	16	3	3,4
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>
Luanda	Belas	0	0	0	2	2	1	50,0
	Cacuaco	63	0	2	340	54	19	5,6
	Ingombota	0	0	0	1	1	0	0,0
	Sambizanga	1	0	0	6	2	0	0,0
	Maianga	1	0	0	1	0	0	0,0
	Camama	0	0	0	2	0	0	0,0
	Cazenga	0	0	0	4	0	0	0,0
	Mulenvos	1	0	0	6	2	0	0,0
	Hoje Ya Henda	0	0	0	10	0	0	0,0
	Talatona	1	0	0	1	0	0	0,0
	Viana	0	0	0	11	3	0	0,0
<b>Total</b>		<b>67</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>384</b>	<b>64</b>	<b>20</b>	<b>5,2</b>
<b>PAÍS</b>		<b>86</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>508</b>	<b>96</b>	<b>27</b>	<b>5,3</b>

Quadro 1: Total de casos, casos positivos e óbitos por província.

## CURVA EPIDÉMICA

## CASOS E ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 2: Casos e óbitos diário por data do início dos sintomas. 31 de Dezembro de 2024 até 17 de Janeiro 2025




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária

- **Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- **Caso confirmado:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.

## DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **86** casos de cólera, sendo **67** na província de Luanda (Cacuaco: 63, Sambizanga: 1, Maianga: 1, Mulevos: 1 e Talatona: 1); **13** na província do Bengo, município do Dande e **6** na província do Icolo e Bengo, município do Sequele;
- O laboratório do INIS, confirmou, **16** casos;
- Ocorreram **3** óbitos, sendo **1** intra-hospitalar registado no Município do Dande, província do Bengo e **2** extra-hospitalares no município do Cacuaco, província de Luanda;
- 16** amostras estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS, sendo **4** do município do Cacuaco, **2** do município de Mulenvos, **1** da Maianga e **1** de Talatona, na província de Luanda; **2** no município de Quiçama e **1** no Calumbo, na província de Icolo e Bengo, **4** do município do Dande e **1** no Panguila, na província do Bengo;
- Estão internados **50** casos, sendo **21** na província de Luanda (**20** no Hospital Municipal do Cacuaco e **1** no Hospital Geral dos Cajueiros); **19** na província do Bengo (**9** no Hospital Municipal do Dande, **7** no Hospital Provincial do Bengo e **3** no Hospital Geral Rev Guilherme Pereira Inglês); **10** na província do Icolo e Bengo (**6** no Centro Materno Infantil da Funda, **2** no Hospital Geral Heróis de Quifangondo, **1** no Hospital Municipal da Quiçama e **1** no Hospital Municipal de Catete).

## DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **508** casos, com idades compreendidas entre 2 e 76 anos, dos quais **238 (47,0%)** do sexo masculino e **270 (53,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **27** óbitos, dos quais **20** na província de Luanda (Cacuaco: 19 e 1 no Belas); **4** na província do Bengo (Dande: 2, Panguila e Barra do Dande: 1) e **3** na província do Icolo e Bengo (Sequele: 3).

## INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

### O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

### COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

### MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

### PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;



4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;



5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;
8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;