



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

ACTUALIZADO: 09-02-2025, às 18h

BOLETIM Nº 33/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 7

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **157** novos casos de cólera, sendo **76** na Província de Luanda, **57** na Província do Bengo, **19** na Província do Icolo e Bengo, **4** na Província do Cuanza Sul e 1 na Província de Malanje;
- Ocorreram **4** óbitos, sendo **2** na Província do Bengo no Município do Dande, 1 deles extra-hospitalar, **1** na Província do Cuanza Sul, no Município de Libolo e **1** na Província de Luanda, no Município de Hoji Ya Henda, com idades entre 4 e 50 anos;
- A taxa de letalidade é de **2,5 %**;
- A população alvo estimada para a vacinação foi reajustada, tendo passado de **930.572** para **1.079.476** habitantes. Desta população foi vacinado um total de **925.573** pessoas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de **86,0%** da população alvo. Do total vacinado, 626.079 foram na província de Luanda, 228.058 no Icolo e Bengo e 71.436 na província do Bengo.

157 Novos Casos


04 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas			Total cumulativo desde a 1ª			Taxa de Letalidade (%)
		total de Casos	Positiv	Óbito	total de Casos	Positiv	Óbito	
Bengo	Ambriz	0	0	0	3	1	0	0,0
	Barra do Dande	22	0	0	392	13	6	1,5
	Dande	21	0	2	408	70	12	2,9
	Nambuquongo	0	0	0	30	14	14	46,7
	Pangula	13	0	0	209	15	6	2,9
	Piri	0	0	0	1	0	0	0,0
	Uibaze	0	0	0	1	0	1	100,0
Úcuá	1	0	0	75	5	2	2,7	
Total		57	0	2	1.119	118	41	3,7
Cuanza Norte	Cambambe	0	0	0	1	1	0	0,0
	Samba Laju	0	0	0	1	1	0	0,0
	Icota	0	0	0	2	2	0	0,0
Cuanza Sul	Libolo	4	4	1	4	4	1	25,0
	Uibala	0	0	0	5	4	1	20,0
	Icota	4	4	1	9	8	2	22,2
Cunene	Cuanhama	0	0	0	1	1	0	0,0
	Icota	0	0	0	1	1	0	0,0
	Cuma	0	0	0	1	1	0	0,0
Huambo	Huambo	0	0	0	4	4	0	0,0
	Catechungo	0	0	0	1	1	0	0,0
	Icota	0	0	0	6	6	0	0,0
Huila	Hogge	0	0	0	1	1	0	0,0
	Lubango	0	0	0	4	4	0	0,0
	Icota	0	0	0	5	5	0	0,0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	3	0	0,0
	Calumbo	0	0	0	9	9	0	0,0
	Catete	0	0	0	18	3	2	11,1
	Cabiri	0	0	0	4	0	1	25,0
	Hom Jesus	1	0	0	1	0	0	0,0
	Sequele	18	0	0	355	55	9	2,5
	Total		19	0	0	390	70	12
Luanda	Belas	3	1	0	29	22	2	6,9
	Cacuaco	95	0	0	979	80	24	2,5
	Ingombota	0	0	0	24	14	0	0,0
	Sambizanga	4	4	0	48	28	4	8,3
	Rangel	0	0	0	9	5	0	0,0
	Maianga	1	1	0	18	15	0	0,0
	Samba	0	0	0	21	18	1	4,8
	Camama	0	0	0	2	0	0	0,0
	Cazenga	2	1	0	55	40	3	5,5
	Mulenvos	0	0	0	125	16	3	2,4
	Kilamba	0	0	0	3	3	1	33,3
	Hoji Ya Henda	8	0	1	86	3	5	5,8
	Kilamba Kixi	0	0	0	21	20	2	9,5
Talatona	1	1	0	9	6	0	0,0	
Viana	2	1	0	72	24	1	1,4	
Total		76	9	1	1.501	294	46	3,1
Malanje	Malanje	1	1	0	5	5	0	0,0
Total		1	1	0	5	5	0	0,0
Zaire	Lomboco	0	0	0	5	5	0	0,0
Total		0	0	0	5	5	0	0,0
País		157	14	4	3.043	514	101	3,3

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS



CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 9 de Fevereiro de 2025)

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária



DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Foram notificados **157** casos de cólera, sendo **76** na Província de Luanda (Cacuaco: 55, Hoji Ya Henda: 8, Sambizanga: 4, Belas: 3, Cazenga e Viana: 2, Talatona e Maianga: 1); **57** na Província do Bengo (Barra do Dande: 22, Dande: 21, Panguila: 13 e Úcuá: 1); **19** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 18 e Bom Jesus: 1); **4** no Município do Libolo na Província do Cuanza Sul e **1** no Município de Malanje na Província de Malanje;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **11** amostras, 6 de Luanda: (Sambizanga: 3, Maianga, Talatona e Kilamba Kiaxi: 1), 2 das Províncias do Bengo (Nambuangongo) e do Cuanza Sul (Quibala) e 1 na Província de Malanje (Malanje);
- Estão internados **270** pacientes, sendo **125** na Província de Luanda (39 no HM de Sambizanga, 37 no HM do Cacuaco, 18 no CTC do Belo Monte, 15 no CS de Paraíso, 12 no CS AA Neto, 3 no HMI Mãe Jacinta Paulino e 1 no CS de Viana); **86** na Província do Bengo (41 no H.P.do Bengo, 16 no H.G.da Barra do Dande, 11 no CS do Panguila, 8 no H.M.do Dande, 5 no no CMI das Mabúbas, 3 no H.G.do Bengo e 2 no Posto Vale do Paraíso); **50** na Província do Icolo e Bengo, (36 no H.G.Heróis do Kifangondo, 5 no CMI da Funda e 3 no H.M.de Catete, no CS da Funda e no CS do Mayombe); **4** na Província do Cuanza Sul no Posto de Saúde do Mabulo; **2** na Província do Huambo (1 no Hospital Central e no CS do Cuima); **1** na Província do Cuanza Norte no H.M.de Cambambe, na Província do Zaire no CTC do Tomboco e na Província da Huíla no H.M da Eiwa.

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **3.043** casos, sendo **1.501** casos na Província de Luanda; **1.119** na Província do Bengo; **390** na Província do Icolo e Bengo; **9** na Província do Cuanza Sul, **6** na Província do Huambo, **5** nas Províncias da Huíla, Malanje e Zaire; **2** na Província do Cuanza Norte e **1** na Província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **1.616 (56,0%)** do sexo masculino e **1.270 (44,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **101** óbitos (extra-hospitalares: 35 (35,0%) e intra-hospitalares: 66 (65,0%), dos quais **46** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Hoji Ya Henda: 5, Sambizanga: 4, Mulenvos e Cazenga : 3, Belas e Kilamba Kiaxi: 2, Kilamba, Samba e Viana: 1); **41** na Província do Bengo (Nambuangongo: 14; Dande: 12, Panguila e Barra do Dande: 6, Úcuá: 2, Quibaxe: 1), **12** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 9, Catete: 2, Cabiri: 1) e **2** na Província do Cuanza Sul (Libolo e Quibala: 1), com idades compreendidas entre 2 e 76 anos, dos quais **74 (73,0%)** do sexo masculino e **27 (27,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;
4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;
5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;



- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de 2 anos de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.