



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

BOLETIM Nº 32/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 6

ACTUALIZADO: 08-02-2025, às 18h

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **295** novos casos de cólera, sendo **160** na Província do Bengo, **114** na província de Luanda, **19** na Província do Icolo e Bengo e **1** nas Províncias do Huambo e do Cuanza Sul;
- Ocorreram **6** óbitos, sendo **3** na Província do Bengo nos Municípios de Nambuangongo e Dande, **2** na Província do Icolo e Bengo nos Municípios de Sequele e Cabiri e **1** na Província de Luanda, no Município de Hoji Ya Henda, sendo todos intra-hospitalares, com idades entre 25 e 67 anos;
- A taxa de letalidade é de **2,0 %**;
- Foi vacinado um total de **925.026** pessoas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de **99,4%** da população alvo. Do total vacinado, 625.681 foram na província de Luanda, 228.058 no Icolo e Bengo e 71.287 na província do Bengo.

295 Novos Casos

06 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			Taxa de Letalidade (%)
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	
Bengo	Ambriz	3	1	0	3	1	0	0,0
	Barra do Dande	59	1	0	370	13	6	1,6
	Dande	41	2	1	387	70	10	2,6
	Nambuangongo	8	0	2	30	14	14	46,7
	Pangulia	31	0	0	196	15	6	3,1
	Piri	1	0	0	1	0	0	0,0
	Quibaxe	0	0	0	1	0	1	100,0
Úcuá	17	0	0	74	5	2	2,7	
Total		160	4	3	1 062	118	39	3,7
Cuanza Norte	Cambambe	0	0	0	1	1	0	0,0
	Samba Cajú	0	0	0	1	1	0	0,0
Total		0	0	0	2	2	0	0,0
Cuanza Sul	Quibala	1	0	0	5	4	1	20,0
	Total	1	0	0	5	4	1	20
Cunene	Cuanhama	0	0	0	1	1	0	0,0
	Total	0	0	0	1	1	0	0,0
Huambo	Cuíma	1	1	0	1	1	0	0,0
	Huambo	0	0	0	4	4	0	0,0
	Catchiungo	0	0	0	1	1	0	0,0
	Total	1	1	0	6	6	0	0,0
Huila	Hoque	0	0	0	1	1	0	0,0
	Lubango	0	0	0	4	4	0	0,0
	Total	0	0	0	5	5	0	0,0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	3	0	0,0
	Calumbo	0	0	0	9	9	0	0,0
	Catete	0	0	0	18	3	2	11,1
	Cabiri	1	0	1	4	0	1	25,0
	Sequele	18	1	1	337	55	9	2,7
	Total	19	1	2	371	70	12	3,2
Luanda	Belas	2	1	0	26	21	2	7,7
	Cacuaco	70	1	0	924	80	24	2,6
	Ingombota	1	1	0	24	14	0	0,0
	Sambizanga	1	0	0	44	24	4	9,1
	Rangel	0	0	0	9	5	0	0,0
	Maianga	1	1	0	17	14	0	0,0
	Samba	0	0	0	21	18	1	4,8
	Camama	0	0	0	2	0	0	0,0
	Cazenga	0	0	0	53	39	3	5,7
	Mulenvos	10	0	0	125	16	3	2,4
	Kilamba	0	0	0	3	3	1	33,3
	Hoji Ya Henda	25	0	1	78	3	4	5,1
	Kilamba Kiaxi	0	0	0	21	20	2	9,5
	Talatona	0	0	0	8	5	0	0,0
Viana	4	0	0	70	23	1	1,4	
Total	114	4	1	1 425	285	45	3,2	
Malanje	Malanje	0	0	0	4	4	0	0,0
	Total	0	0	0	4	4	0	0,0
Zaire	Tomboco	0	0	0	5	5	0	0,0
	Total	0	0	0	5	5	0	0,0
PAÍS		295	10	6	2 886	500	97	3,4

2.886

Total de Casos

97

Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS





ÓBITOS



Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

CURVA EPIDÉMICA

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA



DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **295** casos de cólera, sendo **160** na Província do Bengo (Barra do Dande: 59, Dande: 41, Panguila: 31, Úcuá: 17, Nambuangongo: 8, Ambriz: 3 e Piri: 1); **114** na Província de Luanda (Cacuaco: 70, Hoji Ya Henda: 25, Mulenvos: 10, Viana: 4, Belas: 2, Ingombota, Sambizanga, Maianga: 1); **19** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 18 e Cabiri: 1); **1** no Município da Quibala na Província do Cuanza Sul e **1** no Município do Cuima na Província do Huambo;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **18** amostras, 15 de Luanda (Maianga: 7, Samba: 3, Talatona: 2, Belas, Kilamba Kiaxi e Sambizanga: 1), **1** das Províncias do Bengo (Dande), Cuanza Norte (Cambambe) e Malanje (Malanje);
- Estão internados **213** pacientes, sendo **127** na Província do Bengo (59 no H.P.do Bengo, 19 no H.M.do Dande, 14 no H.G.da Barra do Dande, 10 no CS do Panguila, 9 no CS do Úcuá, 5 no CMI das Mabubas, 4 no CS Bela Vista e no Posto Vale do Paraíso e 3 no H.G.do Bengo); **41** na Província de Luanda (11 no HM do Cacuaco, 9 no HM de Kapalanga, 8 no CS Caop A, 6 no CS Uanhenga Xitu, 2 no HMI Mãe Jacinta Paulino e 1 no CS dos Ramiros, no CS de Viana I, no CS de Viana II, no CSR dos Mulenvos e no CTC do Belo Monte); **36** na Província do Icolo e Bengo (22 no H.G.Heróis do Kifangondo, 5 no CMI da Funda, 4 no CS da Funda, 3 no CS do Mayombe, 2 no H.M.de Catete); **4** na Província do Cuanza Sul no Posto de Saúde do Mabulo; **2** na Província do Huambo (1 no Hospital Central e no CS do Cuima); **1** na Província do Cuanza Norte no H.M.de Cambambe, na Província do Zaire no CTC do Tomboco e na Província da Huíla no H.M da Eiwa.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **2.886** casos, sendo **1.425** casos na Província de Luanda; **1.062** na Província do Bengo; **371** na Província do Icolo e Bengo; **6** na Província do Huambo, **5** nas Províncias do Cuanza Sul, Huíla e Zaire; **4** na Província de Malanje; **2** na Província do Cuanza Norte e **1** na Província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **1.616 (56,0%)** do sexo masculino e **1.270 (44,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **97** óbitos (extra-hospitalares: 34 (35,0%) e intra-hospitalares: 63 (65,0%), dos quais **45** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Sambizanga e Hoji Ya Henda: 4, Mulenvos e Cazenga: 3, Belas e Kilamba Kiaxi: 2, Kilamba, Samba e Viana: 1); **39** na Província do Bengo (Nambuangongo: 14; Dande: 10, Panguila e Barra do Dande: 6, Úcuá: 2, Quibaxe: 1), **12** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 9, Catete: 2, Cabiri: 1) e **1** na Província do Cuanza Sul (Quibala), com idades compreendidas entre 2 e 76 anos, dos quais **71 (73,0%)** do sexo masculino e **26 (27,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;
4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;



5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;

- **Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de 2 anos de idade nos locais onde a cólera existir.
- **Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.