



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

ACTUALIZADO: 19-01-2025, às 18h

BOLETIM Nº 12/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 4

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM ANGOLA

TOTAL DE CASOS

576

TOTAL DE ÓBITOS

29

MASCULINO

270

FEMININO

306

MASCULINO

21

FEMININO

8

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas (19 de janeiro de 2025)			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Taxa de Letalidade (%)
Bengo	Barra do Dande	0	0	0	4	2	1	25.0
	Dande	12	9	0	49	26	3	6.1
	Panguiça	1	1	1	7	2	2	28.6
	Úcua	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		13	10	1	61	31	6	9.8
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	2	1	0	0.0
	Sequele	6	0	0	95	17	3	3.2
Total		6	0	0	97	18	3	3.1
Luanda	Belas	4	2	0	6	4	1	16.7
	Cacuaco	12	1	0	361	55	19	5.3
	Ingombota	2	1	0	3	2	0	0.0
	Sambizanga	0	0	0	6	2	0	0.0
	Rangel	1	0	0	2	0	0	0.0
	Maianga	0	0	0	1	0	0	0.0
	Camama	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	0	0	0	4	0	0	0.0
	Mulenvos	0	0	0	6	2	0	0.0
	Hoje Ya Henda	0	0	0	10	0	0	0.0
	Talatona	0	0	0	1	0	0	0.0
	Viana	2	1	0	14	4	0	0.0
Total		21	5	0	416	69	20	4.8
Malanje	Malanje	1	1	0	2	2	0	0.0
Total		1	1	0	2	2	0	0.0
PAÍS		41	16	1	576	120	29	5.0

Quadro 1: Total de casos, casos positivos e óbitos por província.

CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diário por data do início dos sintomas. 31 de Dezembro de 2024 até 19 de Janeiro 2025

CASOS E ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária

- **Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vómitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- **Caso confirmado:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.

DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **41** casos de cólera, sendo **21** na província de Luanda (Cacuaco: 12, Belas: 4, Ingombotas: 2, Viana: 2 e Rangel:1); **13** na província do Bengo (Dande: 12 e Panguila: 1); **6** no município do Sequele, província do Icolo e Bengo e **1** na província de Malange (Malange);
- Foram confirmados **16** casos;
- Ocorreu **1** óbito, extra-hospitalar no Município de Panguila, província do Bengo;
- 27** amostras estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS, sendo **11** da província de Luanda, (Cacuaco: 3), (Belas: 2), (Viana: 2), (Ingombota: 1), (Mulenvos: 1), (Maianga: 1) e (Talatona: 1); **3** na província do Icolo e Bengo (Quiçama: 2) e (Calumbo: 1) e **13** do município do Dande, na província do Bengo;
- Estão internados **60** pacientes, sendo **22** na província de Luanda (18 no Hospital Municipal do Cacuaco, 2 no Hospital Materno Infantil Azancot de Menesses, 1 no Hospital Geral dos Cajueiros e 1 no Hospital Municipal do Sambizanga); **24** na província do Bengo (12 no Hospital Municipal do Dande, 7 no Hospital Provincial do Bengo e 5 no Hospital Geral Rev Guilherme Pereira Inglês); **12** na província do Icolo e Bengo (7 no Hospital Geral Heróis de Quifangondo e 5 no Centro Materno Infantil da Funda); **2** na província de Malange no Hospital Geral.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **576** casos, com idades compreendidas entre 2 e 81 anos, dos quais **270 (47,0%)** do sexo masculino e **306 (53,1%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **29** óbitos, dos quais **20** na província de Luanda (Cacuaco: 19 e 1 no Belas); **6** na província do Bengo (Dande: 3, Panguila: 2 e Barra do Dande: 1) e **3** na província do Icolo e Bengo (Sequele: 3).

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. **Beber e usar a água tratada;**
2. **Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;**



3. **Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;**



4. **Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;**



5. **Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;**
6. **Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;**

7. **Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;**

8. **Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;**

9. **Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;**