



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

ACTUALIZADO: 20-01-2025, às 18h

BOLETIM Nº 13/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 4

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM ANGOLA

TOTAL DE CASOS

612

TOTAL DE ÓBITOS

29

MASCULINO

FEMININO

293

319

MASCULINO

FEMININO

21

8

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas (20 de janeiro de 2025)			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Taxa de Letalidade (%)
Bengo	Barra do Dande	0	0	0	4	2	1	25,0
	Dande	2	1	0	51	27	3	5,9
	Panguiã	1	2	0	8	4	2	25,0
	Úcua	0	0	0	1	1	0	0,0
Total		3	3	0	64	34	6	9,4
Icolo e Bengo	Quiçama	1	0	0	3	1	0	0,0
	Calumbo	1	1	0	1	1	0	0,0
	Catete	1	0	0	1	0	0	0,0
	Sequele	7	2	0	102	19	3	2,9
Total		10	3	0	107	21	3	2,8
Luanda	Belas	0	0	0	6	4	1	16,7
	Cacuaco	18	1	0	379	56	19	5,0
	Ingombota	0	0	0	3	2	0	0,0
	Sambizanga	1	1	0	7	3	0	0,0
	Rangel	0	0	0	2	0	0	0,0
	Maíanga	0	0	0	1	0	0	0,0
	Camama	0	0	0	2	0	0	0,0
	Cazenga	0	0	0	4	0	0	0,0
	Mulenvos	1	1	0	7	3	0	0,0
	Kilamba	1	1	0	1	1	0	0,0
	Hoji Ya Henda	1	1	0	11	1	0	0,0
	Kilamba Kiaxi	1	1	0	1	1	0	0,0
	Talatona	0	0	0	1	0	0	0,0
Viana	0	0	0	14	4	0	0,0	
Total		23	6	0	439	75	20	4,6
Malanje	Malanje	0	0	0	2	2	0	0,0
Total		0	0	0	2	2	0	0,0
PAÍS		36	12	0	612	132	29	4,7

Quadro 1: Total de casos, casos positivos e óbitos por província.

CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diário por data do início dos sintomas. 31 de Dezembro de 2024 até 20 de Janeiro 2025

CASOS E ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária

- **Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- **Caso confirmado:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.

DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **36** casos de cólera, sendo **23** na província de Luanda (Cacuaco: 18, Kilambi Kiayi, Kilamba, Hoji Ya Henda, Sambizanga e Mulenvos: (1); **10** na província do Icolo e Bengo (Sequele: 7, Calumbo, Catete e Quiçama: (1) e **3** na província do Bengo (Dande: 2 e Panguila: 1);
- Foram confirmados **12** casos;
- Não se registou nenhum óbito;
- 23** amostras estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS, sendo **11** da província de Luanda, (Cacuaco: 4), (Belas: 3), (Viana: 1), (Ingombota: 1), (Maianga: 1) e (Talatona: 1); **3** na província do Icolo e Bengo (Quiçama: 2) e (Calumbo: 1) e **9** do município do Dande, na província do Bengo;
- Estão internados **80** pacientes, sendo **55** na província de Luanda (49 no Hospital Municipal do Cacuaco, 4 no Hospital Geral dos Cajueiros e 2 no Hospital Municipal do Sambizanga); **12** na província do Bengo (5 no Hospital Provincial do Bengo, 5 no Hospital Geral Rev Guilherme Pereira Inglês e 2 no Hospital Municipal do Dande); **11** na província do Icolo e Bengo (4 no Hospital Geral Heróis de Quifangondo e 3 no Centro Materno Infantil da Funda, 2 Centro de saúde do Mayombe, 1 Hospital Municipal de Catete e 1 no Hospital Municipal da Quiçama); **2** na província de Malange no Centro de Tratamento da Cólera em Malange.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **612** casos, com idades compreendidas entre 2 e 81 anos, dos quais **293 (48,0%)** do sexo masculino e **319 (52,1%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **29** óbitos, dos quais **20** na província de Luanda (Cacuaco: 19 e 1 no Belas); **6** na província do Bengo (Dande: 3, Panguila: 2 e Barra do Dande: 1) e **3** na província do Icolo e Bengo, município de Sequele.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. **Beber e usar a água tratada;**
2. **Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;**



3. **Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;**



4. **Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;**



5. **Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;**
6. **Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;**

7. **Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;**

8. **Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;**

9. **Manter sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;**