



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

BOLETIM Nº 14/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 4

ACTUALIZADO: 21-01-2025, às 18h

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **59** novos casos de cólera, sendo **45** na Província de Luanda, **10** na Província do Icolo e Bengo, **3** na Província do Bengo e **1** na Província do Huambo;
- Foram registados **3** óbitos na Província de Luanda, sendo **2** em Cacuaço e **1** nos Mulenvos.

59

Novos Casos

3

Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

| PROVÍNCIA | MUNICÍPIO | Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas | | | Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025 | | | Taxa de Letalidade (%) |
|---------------|----------------|---|-----------------|----------|---|-----------------|-----------|------------------------|
| | | Total de Casos | Casos Positivos | Óbitos | Total de Casos | Casos Positivos | Óbitos | |
| Bengo | Barra do Dande | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25.0 |
| | Dande | 3 | 3 | 0 | 54 | 30 | 3 | 5.6 |
| | Panguila | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 25.0 |
| | Úcua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | | 3 | 4 | 0 | 67 | 38 | 6 | 9.0 |
| Huambo | Huambo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Icolo e Bengo | Quiçama | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
| | Calumbo | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| | Catete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Sequele | 9 | 6 | 0 | 111 | 25 | 3 | 2.7 |
| TOTAL | | 10 | 7 | 0 | 117 | 28 | 3 | 2.6 |
| Luanda | Belas | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 14.3 |
| | Cacuaço | 25 | 6 | 2 | 404 | 62 | 21 | 5.2 |
| | Ingombota | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
| | Sambizanga | 4 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0.0 |
| | Rangel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Maianga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Camama | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Cazenga | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 |
| | Mulenvos | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10.0 |
| | Kilamba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | Hoji Ya Henda | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.0 |
| | Kilamba Kiaxi | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
| | Talatona | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| Viana | 6 | 4 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0.0 | |
| TOTAL | | 45 | 23 | 3 | 484 | 98 | 23 | 4.8 |
| Malanje | Malanje | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| PAÍS | | 59 | 35 | 3 | 671 | 167 | 32 | 4.8 |

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província.

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

671

Total de Casos

32

Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS



MASCULINO

FEMININO



326

345

ÓBITOS



MASCULINO

FEMININO



23

9

CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 21 de Janeiro 2025).

CASOS E ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária.



DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **59** casos de cólera, sendo **45** na Província de Luanda (Cacuaco: 25, Viana: 6, Sambizanga e Cazenga: 4, Mulenvos: 3, Belas, Kilambi Kiaxi e Talatona: 1); **10** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 9 e Calumbo: 1), **3** na Província do Bengo (Dande: 3) e **1** Caso na sede municipal da Província do Huambo, com vínculo epidemiológico com o Município do Cacuaco em Luanda;
- 26** amostras estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS, sendo **16** da Província de Luanda, (Cacuaco: 5), (Belas: 4), (Sambizanga: 2), (Viana: 1), (Ingombota: 1), (Cazenga: 1), (Kilamba Kiaxi: 1) e (Talatona: 1); **3** na Província do Icolo e Bengo (Quiçama: 2) e (Calumbo: 1) e **7** do Município do Dande, na Província do Bengo;
- Estão internados **75** pacientes, sendo **45** na Província de Luanda (27 no Hospital Municipal do Cacuaco, 9 no H.M. Infantil Azancot de Menezes, 6 no Hospital Municipal do Cazenga e 3 no Hospital Geral dos Cajueiros); **6** na Província do Bengo (1 no Hospital Provincial do Bengo, 1 no Hospital Geral Rev Guilherme Pereira Inglês e 4 no Hospital Municipal do Dande); **21** na Província do Icolo e Bengo (7 no Hospital Geral Heróis de Quifangondo, (6 no Centro Materno Infantil da Funda, 4 Centro de saúde do Mayombe e 3 Hospital Municipal de Catete); **2** na Província de Malange no Centro de Tratamento da Cólera e **1** no Hospital Geral do Huambo.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **671** casos, sendo **484** na Província de Luanda, **117** na Província do Icolo e Bengo, **67** no Bengo, **2** na Província de Malanje e **1** na Província do Huambo, com idades compreendidas entre 2 e 81 anos, dos quais **326 (49,0%)** do sexo masculino e **345 (51,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **32** óbitos, dos quais **23** na Província de Luanda (Cacuaco: 21 e 1 no Belas e Mulenvos); **6** na Província do Bengo (Dande: 3, Panguila: 2 e Barra do Dande: 1) e **3** na Província do Icolo e Bengo, Município de Sequele, com idades compreendidas entre 3 e 69 anos, dos quais **23 (72,0%)** do sexo masculino e **9 (28,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. **Beber e usar a água tratada;**
2. **Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;**



3. **Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;**



4. **Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;**



5. **Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;**
6. **Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;**

7. **Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;**

8. **Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;**

9. **Manter sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;**

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.