

# BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

ACTUALIZADO: 25-01-2025, às 18h

BOLETIM Nº 18/2025 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 4

#### **DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h**

- Foram reportados 64 novos casos de cólera, sendo 40 na Província de Luanda, 14 na Província do Icolo e Bengo, 9 no Bengo e 1 na província da Huíla. O caso notificado na província da Huíla, está relacionado com o Município da Maianga, Província de Luanda;
- Foi registado 1 óbito na Província do Bengo, município do Panguila.




### DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

#### Epidemiológica de 2025 PROVÍNCIA MUNICÍPIO Casos Total de Casos Positivos **Positivos** Barra do Dande 25,0 Dande 6 0 0 3,8 Bengo Panguila 3 20 11 20,0 Úcua 0 0.0 otal 105 7,6 Huambo Huambo 0 otal Hoque 0,0 Huíla Lubango Quicama 0 0 0 0.0 0 Ô 0,0 Calumbo Icolo e Bengo Catete 0,0 Sequele 14 n 189 45 9,1 4,1 Belas 2 0 11 28 0 583 69 Cacuaco Ingombota 0 Sambizanga 0 0 10 5,9 ō 0.0 Rangel 0 0 0 Maianga 0 0.0 0 Samba 0 0,0 Luanda Camama 0 0 0 Cazenga Mulenvos 0 11,1 Kilamba 0 0 0 0,0 Hoji Ya Henda 0 0 0 11 5 0.0 ō 20,0 Kilamba Kiaxi 0 Talatona Viana 0,0 Total 40 715 137 30 Malanje Malanje 0 0 0 0.0


Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província.


### **CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS**



#### **CURVA EPIDÉMICA**

## DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

















# **Boletim Informativo da Cólera**

#### **DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h**

- Foram reportados 64 casos de cólera, sendo 40 na Província de Luanda (Cacuaco: 28, Cazenga e Viana: 3, Belas e Sambizanga 2, Talatona e Maianga: 1); **14** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 12 e Catete: 2); **9** na Província do Bengo (Dande: 6 e Panguila: 3) e 1 na Província da Huíla (Município do Lubango);
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS 23 amostras, sendo 16 da Província de Luanda, (Sambizanga: 4), (Cazenga e Samba: 2), (Belas, Cacuaco, Ilha do Cabo, Ingombota, C.Kilamba, Kilamba Kiaxi, Maianga e Talatona: 1); **3** na Província do Icolo e Bengo (Calumbo: 2) e (Catete: 1); 3 na Província de Malange do Município de Malange • è 1 na Província do Huambo, do Município de Cachiungo;
- Estão internados 98 pacientes, sendo 56 na Província de Luanda (46 no Hospital Municipal do Cacuaco, 5 no Hospital Geral dos Cajueiros, 3 no Hospital Municipal do Cazenga, 1 no Hospital Materno Infantil Azancot de Menezes e 1 no Centro de Tratamento de Cólera de Talatona); 19 na Província do Bengo (11 no Hospital Provincial do Bengo, 5 no Hospital Municipal do Dande, 2 no Hospital Geral Rev. Guilherme Pereira Inglês e 1 no Hospital Geral da Barra do Dande); 18 na Província do Icolo e Bengo (12 no Hospital Geral Heróis do Quifangondo, 3 no Centro Materno Infantil da Funda e 3 no Hospital Municipal de Catete); 1 na Província de Malange no Centro de Tratamento da Cólera, 2 no Hospital Geral do Huambo e 2 na Província da Huila (1 no Hospital Municipal do Hoque e 1 no CTC do Lewa, Município do Lubango).

#### **DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS**

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 1.016 casos, sendo 715 na Província de Luanda, 189 na Província do Icolo e Bengo, 105 no Bengo, 3 na Província de Malanje, 2 na Província do Huambo e 2 na Província da Huíla, com idades compreendidas entre 2 e 81 anos, dos quais 489 (48,0%) do sexo masculino e 527 (52,0%) do sexo feminino;
- Ocorreram 43 óbitos, dos quais 30 na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos: 2 e 1 no Belas, Cazenga, Kilamba Kiaxi e Sambizanga); 8 na Província do Bengo (Panguila: 4, Dande: 3 e Barra do Dande: 1) e 5 na Província do Icolo e Bengo, Município de Sequele, com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais 29 (67,0%) do sexo masculino e 14 (33,0%) do sexo

# **INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO**

#### O OUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

#### COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

- 1.Beber água não tratada;
- 2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
- 3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
- 4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
- 5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
- 6. Não lavar as mãos após defecar.

#### MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

tiver diarreia líguida vômitos, е imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.

#### PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



- 1. Beber e usar a água tratada;
- 2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



- 3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool gel várias vezes ao dia;
- 4. Lavar bem as frutas e os legumes com águafervida ou água tratadacom lixívia;



- 5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-osbem tapados;
- 6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixivia;
- 7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



- 8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
- 9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;
- Caso: doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vómitos e doentes acima de 2 anos de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo: caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.











