



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

BOLETIM Nº 30/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 6

ACTUALIZADO: 06-02-2025, às 18h

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **213** novos casos de cólera, sendo **134** na província do Bengo, **55** na Província de Luanda, **23** na Província do Icolo e Bengo e **1** na Província do Huambo;
- Ocorreram **2** óbitos na Província do Bengo, nos Municípios de Dande e Úcuá, sendo 1 extra-hospitalar, com idades de 14 e 35 anos;
- A taxa de letalidade é **0,9 %**.

213 Novos Casos

02 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Taxa de Letalidade (%)
Bengo	Barra do Dande	66	2	1	289	12	6	2,1
	Dande	35	1	0	346	68	9	2,6
	Nambuagongo	0	0	0	2	2	2	100,0
	Pangula	15	0	0	163	15	6	3,7
	Quibave	0	0	0	1	0	1	100,0
	Úcuá	18	0	1	57	5	2	3,5
Total		134	3	2	858	102	26	3,0
Cuanza Norte	Cambambe	0	0	0	1	1	0	0,0
	Samba Cajú	0	0	0	1	1	0	0,0
Total		0	0	0	2	2	0	0
Cunene	Cuanhama	0	0	0	1	1	0	0,0
		0	0	0	1	1	0	0,0
Total		0	0	0	1	1	0	0
Huambo	Huambo	1	1	0	4	4	0	0,0
	Catchungo	0	0	0	1	1	0	0,0
Total		1	1	0	5	5	0	0,0
Huila	Hoque	0	0	0	1	1	0	0,0
	Lubango	0	0	0	3	3	0	0,0
Total		0	0	0	4	4	0	0,0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	3	0	0,0
	Calumbo	2	2	0	9	9	0	0,0
	Catete	0	0	0	15	3	2	13,3
	Cabiti	0	0	0	3	0	0	0,0
	Sequele	21	0	0	297	52	8	2,7
Total		23	2	0	327	67	10	3,1
Luanda	Belas	0	0	0	23	19	2	8,7
	Cacuaco	27	1	0	836	79	24	2,9
	Ingombota	0	0	0	22	12	0	0,0
	Sambizanga	3	2	0	38	22	2	5,3
	Rangel	1	0	0	6	2	0	0,0
	Maianga	3	2	0	15	12	0	0,0
	Samba	3	3	0	21	18	1	4,8
	Camama	0	0	0	2	0	0	0,0
	Cazenga	6	5	0	52	38	3	5,8
	Mulenvos	2	1	0	105	14	3	2,9
	Kilamba	0	0	0	3	3	1	33,3
	Hoji Ya Henda	5	0	0	53	3	3	5,7
	Kilamba Kiayi	1	1	0	18	17	1	5,6
	Talatona	0	0	0	8	5	0	0,0
Viana	4	0	0	65	23	1	1,5	
Total		55	15	0	1267	267	41	3,2
Malanje	Malanje	0	0	0	4	4	0	0,0
		0	0	0	4	4	0	0,0
Total		0	0	0	4	4	0	0,0
Zaire	Tomboco	0	0	0	4	4	0	0,0
		0	0	0	4	4	0	0,0
Total		0	0	0	4	4	0	0,0
PAÍS		213	21	2	2472	456	77	3,1

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

2.472

Total de Casos

77


Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO


CASOS




ÓBITOS



CURVA EPIDÉMICA



DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA



DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **213** casos de cólera, sendo **134** na Província do Bengo (Barra do Dande: 66, Dande: 35, Panguila: 15, Úcuá: 18); **55** na Província de Luanda (Cacuaco: 27, Cazenga: 6, Hoji Ya Henda: 5, Viana: 4, Samba, Sambizanga e Maianga: 3, Mulenvos: 2, Kilamba Kiaxi e Rangel: 1); **23** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 21, Calumbo: 2); **1** no Município do Huambo na Província do Huambo;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **21** amostras, 17 de Luanda: (Maianga: 5, Samba: 4, Sambizanga: 3, Talatona e Kilamba Kiaxi: 2 e Cazenga: 1), **1** da Província do Bengo (Dande), Icolo e Bengo (Calumbo), Cuanza Norte (Cambambe) e Malanje (Malanje);
- Estão internados **170** pacientes, sendo **40** na Província de Luanda (10 no Hospital Geral dos Cajueiros, 8 no CTC Kapalanga, 6 no CS Uanhenga Xitu, 5 no Hospital Municipal do Cazenga, 4 no CS Samba, 3 no C.S da Caoop A, 2 no HMI Mãe Jacinta Paulino, 1 no CS de Viana II e no CSR dos Mulenvos); **89** na Província do Bengo (44 no Hospital Provincial do Bengo, 14 no Hospital Geral da Barra do Dande, 12 no CS do Panguila, 11 no Hospital Municipal do Dande, 7 no CMI das Mabubas e 1 no Posto Vale do Paraíso); **39** na Província do Icolo e Bengo, (25 no Hospital Geral Heróis do Kifangondo, 8 no CMI da Funda, 2 no CS do Mayombe e no CS da Funda, 1 no Hospital Municipal de Catete e no CS do Km 30); **1** na Província do Kwanza Norte no Hospital Municipal de Cambambe e na Província do Huambo no Hospital Central.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **2.472** casos, sendo **1.267** casos na Província de Luanda; **858** na Província do Bengo; **327** na Província do Icolo e Bengo; **5** na Província do Huambo; **4** nas Províncias de Malanje, Huíla e Zaire; **2** na Província do Cuanza Norte e **1** na Província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **1.357 (55,0%)** do sexo masculino e **1.115 (45,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **77** óbitos (extra-hospitalares: 32 (41,6%) e intra-hospitalares: 45 (58,4%), dos quais **41** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos, Cazenga e Hoji Ya Henda: 3, Sambizanga e Belas: 2, Kilamba Kiaxi, Kilamba, Samba e Viana: 1); **26** na Província do Bengo (Dande: 9, Panguila e Barra do Dande: 6, Nambuangongo e Úcuá: 2, Quibaxe: 1) e **10** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 8 e Catete: 2), com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **53 (68,8%)** do sexo masculino e **24 (31,2%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;
4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;



5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de 2 anos de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.