



# BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA  
MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

BOLETIM Nº 29/2025  
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 6

ACTUALIZADO: 05-02-2025, às 18h

## DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **190** novos casos de cólera, sendo **92** na província do Bengo, **87** na Província de Luanda, **9** na Província do Icolo e Bengo e **1** nas Províncias de Cuanza Norte e Cunene;
- Ocorreram **5** óbitos, todos intra-hospitalares: **2** na Província do Bengo (Dande e Nambuagongo: 1), **2** na Província do Icolo e Bengo (Catete e Sequele: 1) e **1** na Província de Luanda (Kilamba), com idades entre 2 e 47 anos;
- A taxa de letalidade é **2,6 %**.

**190** Novos Casos

**05** Óbitos

## DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas			Total cumulativo desde a 1ª			Taxa de Letalidade (%)
		Total de Casos	Positiv os	Óbito s	Total de Casos	Positiv os	Óbito s	
Bengo	Barra do Dande	41	0	0	223	10	5	2.2
	Dande	18	2	1	311	67	9	2.9
	Nambuagongo	U	U	1	2	2	2	100.0
	Pangulla	19	0	0	148	15	6	4.1
	Ujube	U	U	U	1	0	1	100.0
Úcuá	14	2	0	39	5	1	2.6	
<b>Total</b>		<b>92</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>724</b>	<b>99</b>	<b>24</b>	<b>3.3</b>
Cuanza Norte	Cambambe	1	1	U	1	1	0	0.0
	Samba Laju	U	U	U	1	1	0	0.0
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Cunene	Cuanhama	1	1	U	1	1	0	0.0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Huambo	Huambo	0	0	0	3	3	0	0.0
	Catanduário	U	U	U	1	1	0	0.0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Huila	Hoiçue	U	U	U	1	1	0	0.0
	Lubango	U	U	U	3	3	0	0.0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	3	0	0.0
	Calumbo	1	1	0	7	7	0	0.0
	Catete	1	0	1	15	3	2	13.3
	Labrin	U	U	U	3	0	0	0.0
Sequele	7	0	1	276	52	8	2.9	
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>304</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>3.3</b>
Luanda	Belas	2	2	0	23	19	2	8.7
	Cacuaco	35	0	0	809	78	24	3.0
	Ingombota	0	0	0	22	12	0	0.0
	Sambizanga	3	1	0	35	20	2	5.7
	Rangel	1	1	0	5	2	0	0.0
	Maianga	2	1	0	12	10	0	0.0
	Samba	5	5	U	19	15	1	5.6
	Camamá	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	9	9	0	46	33	3	6.5
	Mulenvos	13	0	0	103	13	3	2.9
	Kilamba	1	1	1	3	3	1	33.3
	Hoji Ya Henda	8	0	0	48	3	3	6.3
	Kilamba Kiazi	2	2	0	17	16	1	5.9
	Talatona	0	0	0	8	5	0	0.0
Viana	6	2	0	61	23	1	1.6	
<b>Total</b>		<b>87</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1,212</b>	<b>252</b>	<b>41</b>	<b>3.4</b>
Malanje	Malanje	0	0	0	4	4	0	0.0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Zaire	Lomboco	U	U	U	4	4	0	0.0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>PAÍS</b>		<b>190</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>2,259</b>	<b>435</b>	<b>75</b>	<b>3.3</b>

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

## CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

**2.259**

Total de Casos

**75**


Total de Óbitos

## DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

### CASOS



### ÓBITOS



## CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 5 de Fevereiro de 2025)

## DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária



World Health Organization



minsa.gov.ao  
MINISTÉRIO DA SAÚDE

## DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **190** casos de cólera, sendo **92** na Província do Bengo (Barra do Dande: 41, Panguila: 19, Dande: 18, Úcuá: 14); **87** na Província de Luanda (Cacuaco: 35, Mulenvos: 13, Cazenga: 9, Hoji Ya Henda: 8, Viana: 6, Samba: 5, Sambizanga: 3, Belas, Kilamba Kiaxi e Maianga: 2, Rangel e Kilamba: 1); **9** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 7, Calumbo e Catete: 1); **1** no Município de Cuanhama, na Província do Cunene e 1 no Município de Cambambe, na Província do Cuanza Norte;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **20** amostras, 13 de Luanda: (Maianga, Samba, Sambizanga e Viana: 2, Belas, Cazenga, Kilamba Kiaxi e Ingombotas: 1), 4 da Província do Bengo (Dande: 3 e Panguila: 1), 2 do Icolo e Bengo (Calumbo: 2) e 1 na Província do Cuanza Norte no Município de Cambambe e no município de Malanje na Província de Malanje;
- Estão internados **215** pacientes, sendo **70** na Província de Luanda (18 no Hospital Municipal do Sambizanga, 16 no CSR dos Mulenvos, 9 no Hospital Geral dos Cajueiros, 7 no CS Dr. António Agostinho Neto, 6 no CTC Kapalanga, 5 no Hospital Municipal do Cazenga, 2 no CS Samba, no CS do Sambizanga e no CS Uanhenga Xitu, 1 no CS do Bairro Operário, no CS do Ramiros e no CS Viana); **94** na Província do Bengo (35 no Hospital Geral da Barra do Dande, 21 no CS do Panguila, 15 no Hospital Municipal do Dande, 14 no CMI das Mabubas, 6 no Posto Vale do Paraíso e 3 no CS do Úcuá); **50** na Província do Icolo e Bengo, (41 no Hospital Geral Heróis do Kifangondo, 4 no CS do Mayombe, 3 no CS da Funda, 1 no Hospital Municipal de Catete e no CS do Km 30); e **1** na Província do Kwanza Norte no Hospital Municipal de Cambambe.

## DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **2.259** casos, sendo **1.212** casos na Província de Luanda; **724** na Província do Bengo; **304** na Província do Icolo e Bengo; **4** nas Províncias de Malanje, Huambo, Huíla e Zaire; **2** na Província do Cuanza Norte e **1** na Província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **1.213 (54,0%)** do sexo masculino e **1.046 (46,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **75** óbitos (extra-hospitalares: 31 (41,3 %) e intra-hospitalares: 44 (58,7 %), dos quais **41** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos, Cazenga e Hoji Ya Henda : 3, Sambizanga e Belas: 2, Kilamba Kiaxi, Kilamba, Samba e Viana: 1); **24** na Província do Bengo (Dande: 9, Panguila: 6, Barra do Dande: 5, Nambuanguo: 2, Úcuá e Quibaxe: 1) e **10** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 8 e Catete: 2), com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **52 (69,3%)** do sexo masculino e **23 (30,7%)** do sexo feminino.

## INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

### O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

### COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

### MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

### PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;
4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;



5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.